

Sparisoma cretense

Peces óseos

Cordados

Scaridae

Bodianus scrofa


Peces óseos

Cordados

Labridae

Vieja | Parrotfish | Papageifisch

Vieja colorada, pez loro, tarrafilla (juvenil)



Biología y ecología

Nadan de forma tranquila, utilizando las aletas pectorales para impulsarse, a la vez que van ramoneando sobre las algas del fondo, capturando pequeños invertebrados. En ocasiones, pueden observarse grandes grupos, formados por cientos de individuos que, en algunas zonas, reciben el nombre de "chorros" de viejas. Los grandes machos suelen nadar en solitario. Es más común por encima de los 50 metros de profundidad.

Habitán sobre fondos rocosos con vegetación y, también, en sebadales, donde son más frecuentes los alevines y los juveniles.


Es uno de los peces demersales más prolíficos de Canarias, ya que realiza varias puestas al año, entre los meses de junio y octubre. Durante la época reproductiva, se puede observar en las hembras una coloración más acentuada y ver a los machos peleando entre sí.

Es una especie emblemática, objetivo tanto de pescadores profesionales como deportivos y elemento tradicional de la gastronomía canaria.

Curiosidades

Es la única especie de pez loro en aguas canarias, y la única también, cuya hembra presenta una coloración más llamativa que la del macho.

Pueden observarse individuos con una coloración entre gris y rojiza, que reciben el nombre de viejas "meladas".



ESTACIONALIDAD (meses)



DISTRIBUCIÓN EN CANARIAS



DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

Mar Mediterráneo, Océano Atlántico Este: desde Azores hasta Senegal, incluyendo Madeira y Canarias.

Protección en Canarias: Ninguna

Talla mín. captura: 20 cm

Amenazas: Pesca indiscriminada


Rango de prof.: 0 a 100 m

Longitud máx.: 70 cm

Peligrosidad: Ninguna



Barred hogfish | Roter Schweinfisch | Pejeperro



Biología y ecología

Siempre se les observa sobre fondos rocosos o en la base de veriles, gustando de refugiarse en cuevas u oquedades. Generalmente, viven en solitario y menos frecuentemente en pareja (macho y hembra). Nadan impulsándose con las aletas pectorales, de manera muy pausada. Sus caninos prominentes le han valido el sobrenombre de "pejeperro".

Los juveniles, de tonalidades más oscuras, se distribuyen entre los 40 y 100 m de profundidad, a diferencia de otras especies, cuyos juveniles se encuentran en zonas someras. Es carnívoro de pequeños invertebrados (poliquetos, moluscos, erizos y crustáceos).

Tiene interés pesquero y comercial, siendo muy apreciada su carne en algunas zonas.

Curiosidades

Esta especie se ha enrequecido en muchos sectores del Archipiélago Canario. Sin embargo, se ha constatado la relativa buena conservación de sus poblaciones en algunos sectores de la isla de El Hierro y en el Archipiélago Chinijo, principalmente dentro de las reservas marinas.

Los alevines muestran un fondo de negro a rojo oscuro y manchas blancas por todo el cuerpo. Los juveniles presentan una coloración similar a las hembras y manchas claras por el cuerpo.



ESTACIONALIDAD (meses)



DISTRIBUCIÓN EN CANARIAS



DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

Islas de Azores, Madeira, Salvajes, Canarias e islas de Cabo Verde.

Rango de prof.: 10 a 150 m

Longitud máx.: 70 cm

Peligrosidad: Ninguna



Protección en Canarias: Ninguna

Talla mín. captura: No regulada

Amenazas: Pesca indiscriminada

Peces